

# フォルテオ<sup>®</sup>を投与されている患者さまへ

以下のような症状が現れたら、投与をやめ、  
すぐに主治医に連絡を取ってください。

じん麻疹

呼吸困難

顔、唇、舌、  
のどの腫れ

投与すると  
いつも動悸を感じる

吐き気、嘔吐、ひどい便秘、  
目が覚めない、脱力が起こる

すぐに対応する必要はありませんが、フォルテオ<sup>®</sup>には  
以下のような副作用が出ることがあります。

頭痛

悪心

食欲不振

筋肉がピクピクする、  
筋肉のけいれん、  
筋肉の痛み

フォルテオ<sup>®</sup> 投与中・投与終了後にかかわらず、  
骨肉腫と診断されたら、フォルテオ<sup>®</sup> 治療を受けている  
(受けていた) ことをすぐに主治医に伝えてください。

**起立性低血圧、めまいや意識消失が起こることがあります。**

◎ 転倒の危険がありますので、十分に注意してください。

◎ 高血圧治療中の方や低血圧を指摘されたり、めまい、立ちくらみ、動悸等の症状がみられたことのある方は特に注意してください。

◎ めまい、立ちくらみ、動悸、意識がうすれる等の症状が見られた場合には、すぐに座るか横になり、症状がおさまるまでじっとして、おさまってもすぐには動かないようにしてください。その後、主治医に連絡してください。



主治医または薬剤師への連絡先

一般の方・患者様向け フォルテオ<sup>®</sup>電話相談窓口

フリーダイヤル

※(コ ツ) と ※(コ ツ)

通常電話番号

0120-52-10-52 078-242-3649

相談受付窓口対応時間

7:00~22:00

通話料は無料です。携帯電話、PHSからもご利用いただけます。

フリーダイヤルでの接続が出来ない場合、この電話番号におかけください。なお通話料はお客様負担となります。



ペンのことやお薬のこと、  
聞いたらお電話ください。