

# ベージニオ<sup>®</sup>錠を服用される患者さんへ

## — ベージニオ<sup>®</sup>錠を服用するときの注意事項 —

監修 神奈川県立病院機構神奈川県立がんセンター 呼吸器内科 加藤 晃史 先生

ベージニオ<sup>®</sup>錠の服用中に、かんしつせいはいしっかん間質性肺疾患があらわれることがあります。以下のような症状が見られた場合には、**速やかに主治医、もしくは治療を受けている病院や薬局に連絡してください。**

- **階段を登ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる**
- からせき**空咳が出る**
- **発熱する など**



かんしつせいはいしっかん**間質性肺疾患は死に至る可能性がありますので、症状があらわれたときは速やかに診断と治療を行う必要があります。**

### 緊急時の連絡先

- 医療機関名
- 診療科名
- 担当医名
- 電話番号
- 診察券番号

#### <ご家族または介護されている方へ>

緊急時、上記医療機関を受診できない場合は、救急対応が可能な医療機関を受診してください。救急隊員や緊急時受診先の医師などに患者さんの状況を伝えるとき、上記記載の情報(ベージニオを服用していること、間質性肺疾患の症状)もあわせてお伝えください。

ベージニオに関する  
お問い合わせ

ベージニオ相談窓口  
日本イーライリリー株式会社

フリー  
ダイヤル

**0120-526-062**

(365日年中無休/時間9:00-21:00)

医薬品リスク管理計画  
(RMP)

日本イーライリリー株式会社